

Najkrajším darom pre rodiča je úsmev dieťaťa. Úsmev však môže odhalíť naozaj boľavé zúbky. Každý rodič si praje, aby jeho dieťa malo zúbky zdravé, pretože tie sú dôležité nielen pri správnej výslovnosti, mechanickom spracovaní potravy či odhrýzani (čím je ovplyvnené aj trávenie), ale zároveň udržavajú správny priestor pre trvalý chrup. V neposlednom rade je pre dieťa dôležitá aj estetická funkcia, ktorá sa v detskom kolektíve prevuje obzvlášť.



zirkónové zubné korunky pre deti

Pediatricke zubné korunky sa vo všeobecnosti používajú pri liečbe závažných, rozsiahlych zubných kazov. Sú to prefabrikované keramické korunky navrhnuté špeciálne pre deti. Sú vyrobené zo zirkónia (oxid zirkoničitý). Ide o úplne prirodzene vyzerajúce zubné korunky, ktoré sú esteticky príjemné a mimoriadne trvanlivé.

Korunkové zirkónové súpravy obsahujú predbežne vyrobené korunky rôznych rozmerov. Po príprave zuba (odstránení kariezných hmôt a šetrnom obrúsení) vyberie zubný lekár korunku vhodnej veľkosti, ktorá je potom pasívne umiestnená na zub a nacementovaná.

Tieto zubné korunky sú:

- estetické
- vysoko pevné
- nekovové
- odolné voči plaku
- biokompatibilné



MDDr. Barbora Džafičová
stomatológ

**komplexné
stomatologické služby**

STOMAHOL

Po nasadení korunky vyzerá chrup zdravo a prirodzene. Zároveň sa dieťaťu zvýší sebadôvera a sebavedomie. Zirkónium sa používa v pedostomatologii od roku 2010.

Najväčšou výhodou zirkónových koruniek je ich vynikajúci vzhľad a veľmi dobrá odolnosť.

Indikácie

- rozsiahla deštrukcia zubných tkanív kazom
- dyskoloracia zuba (šedé sfarbenie) napr. po úraze
- odumretý zub ošetrený koreňovou výplňou

Ak kaz nie je včas ošetrený, následkom prieniku baktérií do zubnej drene Zub odumrie (opuch, bolest, teplota, fistula) a musí sa vytiahnuť. Hovoríme o predčasnej strate mliečneho zuba.

Ak došlo k predčasnej strate jedného z mliečnych rezákov, môže mať trvalý rezák problém pri prerezavaní – ak zostáva oproti prerezávaniu sa toho istého trvalého zuba na opačnej strane rovnakého zuboradia o viac ako pol roka, treba vyhľadať zubného lekára (napr. ak pravá horná jednotka je prerezaná a ľavá horná jednotka chýba viac ako pol roka od prerezania pravej).



Kontraindikácie

- výrazné stesnanie zubov
- malé množstvo zbytkového zdravého zubného tkaniva
- strata priestoru
- pacienti s ťažkým bruxizmom (škrípanie zubami)

S kazom poškodenými zubami sa v súčasnosti často stretávame u veľmi malých detí (už okolo 2 rokov). Častokrát majú predné zúbky zdeštrúvané vo veľkom rozsahu. Majú bolesti, odmietať odhrýzať potravu. Nastáva problém pri výslovnosti slabik, nehovoriac o estetickej stránke – hanbia sa usmiať v škôlke, v škole, pred kamarátmi či pri fotení.

Aj napriek tomu, že mliečny chrup je nahradzovaný trvalým, strata týchto zubov skôr ako jeden rok pred prerezaním trvalého nástupcu môže mať pre pacienta nepriaznivé následky.

V súčasnosti už vieme aj takto poškodené zúbky zachrániť, a to endodontickým ošetrením (vyčistia sa koreňové kanáliky a vyplňia sa vstrebateľným materiálom). Korunková časť sa ošetri plombou alebo korunkou. Táto možnosť pripadá do úvahy u dobre spolupracujúcich detí, prípadne v celkovej anestézii.

Dôležité je uvedomiť si, že práve rodič je ten, kto preberá zodpovednosť za stav chrupu svojho dieťaťa.